

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

_____ Р.А. Часнойть

11 июля 2008 г.

Регистрационный № 018-0308

**СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ИНЪЕКЦИОННОЙ
ФОРМЫ АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ В КОМПЛЕКСНОЙ
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С ВАЗООККЛЮЗИОННЫМИ
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГЛАЗА**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: ГУО «Белорусская медицинская академия
последипломного образования»

АВТОРЫ: канд. мед. наук, доц. Л.К. Яхницкая, канд. мед. наук
Т.А. Гюрджян, О.Н. Кардаш

Минск 2008

Инструкция предназначена для лечения больных с нарушением кровообращения сосудов сетчатки и зрительного нерва. Может применяться офтальмологами в стационарных отделениях больниц.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Ампула (флакон) препарата ацетилсалициловой кислоты, ампула 2% раствора новокаина, одноразовый шприц.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Вазоокклюзионные заболевания глаза (тромбозы, тромбоэмболии, острые и хронические нарушения кровообращения в системе сосудов, питающих сетчатку и зрительный нерв, претромбозы).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Гиперчувствительность к кислоте ацетилсалициловой.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА

1 этап — приготовление 1% раствора ацетилсалициловой кислоты.

К содержимому ампулы (флакона) с 0,025 или 0,05 г препарата добавляют соответственно 2,5 или 5 мл воды для инъекций и встряхивают до полного растворения. Полученный 1% раствор кислоты ацетилсалициловой используют в течение суток.

2 этап — введение раствора.

Раствор вводится парабульбарно в дозе 0,5 мл ежедневно или через день. На курс лечения необходимо от 5 до 10 инъекций. Для исключения болезненности инъекций в шприц добавляют 0,2–0,3 мл 1% или 2% раствора новокаина, оставшийся в ампуле раствор можно использовать в виде инстилляций по 1–2 капли до 4–5 раз в день.

Предлагаемая схема лечения:

- инстилляции 1% раствора ацетилсалициловой кислоты по 1–2 капли 5 раз в день;
- парабульбарно инъекция 0,5 мл 1% ацетилсалициловой кислоты через день в чередовании с 0,5 мл 1% раствора эмоксипина;
- парабульбарно инъекция 0,3 мл дексаметазона с 0,2 мл гепарина (200 ЕД) 1 раз в 3 дня;
- внутримышечно ежедневно — 2,0 мл 12,5% этамзилата № 10;
- внутривенно через день — 5,0 мл 3% эмоксипина № 5 в чередовании с 5,0 мл 20% пирацетама; курс лечения 10–14 дней.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При соблюдении инструкции по применению препарата побочных действий, осложнений, как правило, не наблюдается. Ацетилсалициловая кислота усиливает действие гепарина. Не следует назначать с другими нестероидными противовоспалительными средствами и смешивать инъекционный раствор препарата с растворами других лекарственных средств. Иногда в области инъекции может быть отек ткани, субконъюнктивальное кровоизлияние, которое устраняется применением 3% раствора калия йодистого в виде инстилляций 4–5 раз в день. Учитывая антикоагулянтное действие ацетилсалициловой кислоты, применение препарата требует осторожности при нарушениях в системе свертывания крови.