

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ



Первый заместитель Министра

Д.Л. Пиневиц

2016г.

Регистрационный № 003-0576

**МЕТОД МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ВО ВРЕМЯ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ
ГИПОКОАГУЛЯЦИЕЙ**

Инструкция по применению

Учреждения разработчики: учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»; учреждение здравоохранения «10-я городская клиническая больница» г. Минска

Авторы: Жаворонок И.С., д.м.н., профессор Кондратенко Г.Г., к.м.н., доцент Карман А.Д., Есепкин А.В.

Минск, 2016

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневиц

20.05.2016

Регистрационный № 023-0516

**МЕТОД МЕСТНОГО ГЕМОСТАЗА ВО ВРЕМЯ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ
У ПАЦИЕНТОВ С СИСТЕМНОЙ ГИПОКОАГУЛЯЦИЕЙ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ: УО «Белорусский государственный
медицинский университет», УЗ «10-я городская клиническая больница» г. Минска

АВТОРЫ: И.С. Жаворонок, д-р мед. наук, проф. Г.Г. Кондратенко, канд. мед.
наук, доц. А.Д. Карман, А.В. Есепкин

Минск 2016

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод местного гемостаза при кровотечении из ложа желчного пузыря во время холецистэктомии у пациентов с системной гипокоагуляцией с использованием отечественного лекарственного средства Гамастат.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-хирургов, иных врачей-специалистов хирургических отделений учреждений здравоохранения Республики Беларусь.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Оборудование:

- общехирургическое оборудование и инструменты, стерильный перевязочный материал;
- лекарственное средство Гамастат, зарегистрированное в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь.

Реактивы:

- диагностические наборы для определения свертывающих свойств крови, биохимических показателей, общих анализов крови.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Диффузные кровотечения из ложа желчного пузыря, включая паренхиматозные геморрагии из ткани печени, во время холецистэктомии у пациентов с системной гипокоагуляцией.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Гиперчувствительность к компонентам Гамастата.
2. Артериальное и активное венозное кровотечение.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

У пациентов с системной гипокоагуляцией после удаления желчного пузыря к его ложу подводят и прижимают печеночным зеркалом на 1–2 мин марлевую салфетку, пропитанную лекарственным средством Гамастат. При этом гемостаз обеспечивается за счет двух компонентов – механической компрессии сосудистой сети и действия гемостатического средства на раневой поверхности. Остановка кровотечения сопровождается формированием фиксированного к раневой поверхности сгустка крови темно-коричневого цвета. При наличии отдельных кровоточащих сосудов осуществляют их прицельную электрокоагуляцию с последующим контролем полноты гемостаза в течение 10 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При применении лекарственного средства Гамастат никаких специфических мероприятий, за исключением обычного медицинского наблюдения, не требуется.

Возможна повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам Гамастата. В этом случае назначается симптоматическое лечение по показаниям.