

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневиц

11.06.2013

Регистрационный № 045-0413

КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ОПИСТОРХОЗА

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. В.Я. Бекиш, д-р мед. наук, проф. В.М. Семенов, канд. мед. наук, доц. Л.Э. Бекиш, канд. биол. наук, доц. В.В. Зорина, Д.К. Кужель

Минск 2013

Настоящая инструкция по применению (далее — инструкция) позволяет повысить клиническую эффективность терапии пациентов с описторхозом в зависимости от возраста, избежать побочных осложнений при лечении только одним празиквантелом и защитить геном человека от повреждений метаболитами кошачьих сосальщиков.

Инструкция предназначена для врачей-инфекционистов, других врачей-специалистов, оказывающих медицинскую помощь пациентам с описторхозом.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. Празиквантель в таблетках по 600 мг.
2. Ибупрофен в таблетках по 200 мг или в 2% суспензии.
3. Витаминный комплекс с селеном (Vit. С — 100 мг, Vit. Е — 30 мг, β-каротин — 6 мг, Se — 0,03 мг) или эти витамины и Se отдельно в таких же дозировках.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Показанием к назначению комбинированной терапии описторхоза является четкое установление диагноза заболевания на основании обнаружения в фекалиях и дуоденальном содержимом пациента яиц кошачьего сосальщика, диспепсических расстройств (снижение аппетита, тошнота, отрыжка, изжога, рвота, боли и вздутия в животе, поносы или их чередование с запорами), клинической симптоматики (повышенная утомляемость, беспокойный сон, боли в эпигастральной области, правом подреберье, гепатомегалия), общего анализа крови (лейкоцитоз, эозинофилия, увеличение СОЭ), биохимического анализа крови (повышение активности трансаминаз — АЛТ и АСТ, щелочной фосфатазы, увеличение прямого билирубина), эпидемиологического анамнеза (употребление в пищу рыбы семейства карповые), а также проведения иммуноферментного анализа с описторхозным антигеном (1:800 и выше).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

При терапии описторхоза необходимо учитывать индивидуальную чувствительность пациентов к празиквантелю, ибупрофену. Противопоказаниями являются: язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения; нарушения со стороны системы кроветворения (тромбоцитопения, агранулоцитоз); непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов; беременность в связи с возможным тератогенным действием празиквантеля. Другие противопоказания к применению комбинированного метода лечения описторхоза отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Лечение описторхоза проводится по схеме в зависимости от возраста пациента:

Препарат	Дозировка препарата	Время приема	Длительность курса
Празиквантель в таблетках по 600 мг	70 мг/кг/сут в три приема	Внутрь после еды	1 день
Ибупрофен в таблетках по 200 мг	<i>Для возраста 8–12 лет — 1/2 таблетки 4 раза в день</i> <i>Для возраста старше 12 лет — 1 таблетка 4 раза в день</i>	Внутрь после еды	3 дня
Витаминный комплекс с селеном	<i>Для возраста 3–15 лет — Vit. С — 50 мг, Vit. Е — 12,5 мг, β-каротин — 1,5 мг, Se — 0,015 мг</i> <i>Для возраста старше 15 лет — Vit. С — 100 мг, Vit. Е — 30 мг, β-каротин — 6 мг, Se — 0,03 мг</i>	Внутрь после еды	3 дня

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ошибки могут возникнуть вследствие несоблюдения схемы лечения описторхоза. Низкая эффективность предложенного способа лечения может быть обусловлена заменой празиквантеля его аналогами, не прошедшими клинического испытания в Республике, а также другими противопаразитарными лекарственными средствами, изменением длительности приема суточной дозы празиквантеля, несоблюдения доз ибупрофена и витаминов с селеном.