

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

\_\_\_\_\_ Д.Л. Пиневиц

04.10.2013

Регистрационный № 083-0813

**МЕТОД ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С НЕСТАБИЛЬНОЙ СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЕ-РАЗРАБОТЧИК: УО «Гродненский государственный медицинский университет»

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. М.А. Лис, канд. мед. наук, доц. К.Н. Соколов,  
О.П. Курбат, канд. мед. наук Д.Г. Корнелюк

Гродно 2013

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен алгоритм дифференцированного лечения пациентов с нестабильной (прогрессирующей) стенокардией напряжения с низким риском развития смерти и инфаркта миокарда.

Инструкция предназначена для врачей-кардиологов, иных врачей-специалистов специализированных отделений, кардиологических диспансеров Республики Беларусь, оказывающих медицинскую помощь пациентам с нестабильной стенокардией напряжения.

Применение этого метода позволит повысить эффективность терапии данной категории пациентов.

## **ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ**

1. Лекарственные средства стандартной терапии (бета-адреноблокаторы, нитроглицерин, нитроглицерин, антикоагулянты, антитромбоцитарные средства, ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента, статины).

2. Кардиальный цитопротектор триметазидина дигидрохлорид 35 мг.

## **ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ**

Ишемическая болезнь сердца: нестабильная (прогрессирующая) стенокардия напряжения с низким риском развития смерти и инфаркта миокарда на 3-е сут госпитализации.

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ**

Индивидуальная непереносимость триметазидина дигидрохлорида.

## **ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА**

Пациентам назначают стандартную терапию ( $\beta$ -адрено-блокатор, нитроглицерин, антикоагулянт, антитромбоцитарное средство, ингибитор ангиотензинпревращающего фермента, статин) согласно действующим национальным рекомендациям.

При выявлении безболевого ишемии миокарда продолжительностью 23–54 мин/сут к лечению на 3-й день добавляют 35 мг триметазидина дигидрохлорида внутрь 2 раза/сут.

## **ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ**

При соблюдении требований к отбору пациентов на этапах обследования применение триметазидина дигидрохлорида осложнений не вызывает.