

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель министра

_____ Р.А. Часнойть
23 мая 2008 г.
Регистрационный № 103-1107

**СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ТЕНИИДОЗОВ, ВКЛЮЧАЮЩИЙ
СПЕЦИФИЧЕСКУЮ, ПАТОГЕНЕТИЧЕСКУЮ
И АНТИОКСИДАНТНУЮ ТЕРАПИЮ**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ: УО «Витебский государственный
медицинский университет»; ГУ «Витебский областной ЦГЭ и ОЗ»

АВТОРЫ: д-р биол. наук, проф. О.-Я.Л. Бекиш, д-р мед. наук, проф. В.М.
Семенов, д-р мед. наук, проф. В.Я. Бекиш, Л.Э. Бекиш, О.Е. Бончак

Витебск 2008

Возбудителями кишечных тениидозов выступают два представителя семейства Taeniidae: *Taeniarhynchus saginatus* — цепень бычий, или цепень невооруженный, и *Taenia solium* — цепень свиной, или цепень вооруженный. Тениидозы относятся к инвазиям, изучение которых имеет большое значение для здравоохранения. Тениоз может осложняться цистицеркозом, поражая глаза и головной мозг больного. Крупный рогатый скот, свиньи являются промежуточными хозяевами для тениид. Больной человек обуславливает заражение финнозом животных, которые выбраковываются, что наносит значительный экономический ущерб государству.

Инструкция предназначена для инфекционистов, терапевтов, эпидемиологов, паразитологов. Она может быть использована при лечении больных в инфекционных, терапевтических отделениях районных, городских больниц, а также в инфекционных областных клинических больницах.

Предлагаемый способ позволяет повысить клиническую эффективность терапии больных тениозом и тениаринхозом, избежать побочных осложнений при лечении только одним антигельминтиком и предупредить повреждения генома хозяина.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, ПРЕПАРАТОВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

1. Празиквантел в таблетках по 600 мг.
2. Индометацин в таблетках по 25 мг.
3. Витаминный комплекс (Vit. С — 100 мг, Vit. Е — 30 мг, β-каротин — 6 мг, Se — 0,03 мг) или эти витамины и Se отдельно в таких же дозировках.
4. Пищеварительный ферментный препарат в драже (таблетках).
5. Солевое слабительное.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Четкий диагноз на основании обнаружения в фекалиях яиц тениид, незрелых и зрелых члеников цепней.

Жалобы на отхождение члеников бычьего цепня при тениаринхозе.

Диспепсические расстройства (тошнота, рвота, снижение аппетита, неустойчивый кашицеобразный стул или запоры).

Клинической симптоматика (боли в правой подвздошной области, потеря веса) и общий анализ крови (лейкоцитоз, эозинофилия).

При длительном течении заболевания отмечаются общая слабость, повышенная утомляемость, раздражительность, бледность кожных покровов, кожные высыпания.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Индивидуальная чувствительность к празиквантелю, индометацину.

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения.

Нарушения со стороны системы кроветворения (тромбоцитопения, агранулоцитоз).

Непереносимость нестероидных противовоспалительных препаратов.
Беременность (в связи с возможным тератогенным действием празиквантеля).

Другие противопоказания к применению способа лечения тениидозов отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПОСОБА

Лечение тениидозов проводится по схеме в зависимости от вида паразита и переносимости антипаразитарных препаратов (табл.).

Таблица

Схема лечения празиквантелем

Тениидозы	Препарат	Доза препарата	Время приема	Длительность курса
Тениаринхоз	Празиквантел в таблетках по 600 мг	25 мг/кг в три приема через 6 ч в течение суток	Внутрь после еды	Одни сутки
	Индометацин в таблетках по 25 мг	25 мг 3 раза в день	Внутрь после еды	3 дня
	Витаминный комплекс	Vit. С — 100 мг, Vit. Е — 30 мг, β-каротин — 6 мг, Se — 0,03 мг	Внутрь после еды	3 дня
	Пищеварительный ферментный препарат, содержащий липазу, амилазу, протеазы	По 2 драже (таблетки) 3 раза в сутки	Внутрь после еды	3 дня
Тениоз	Празиквантел в таблетках по 600 мг	25 мг/кг в три приема через 6 ч в течение суток	Внутрь после еды	Одни сутки
	Индометацин в таблетках по 25 мг	25 мг 3 раза в день	Внутрь после еды	3 дня
	Витаминный комплекс	Vit. С — 100 мг, Vit. Е — 30 мг, β-каротин — 6 мг, Se — 0,03 мг	Внутрь после еды	3 дня
	Пищеварительный ферментный препарат, содержащий липазу, амилазу, протеазы	По 2 драже (таблетки) 3 раза в сутки	Внутрь после еды	3 дня

	Солевое слабительное	Согласно инструкции на препарат	Вечером после приема последней дозы празиквантеля	Одни сутки
--	-------------------------	---------------------------------------	---	------------

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Ошибки могут возникнуть вследствие несоблюдения протокола лечения тениидозов. Низкая эффективность предложенного способа лечения может быть обусловлена заменой празиквантеля его аналогами, не прошедшими клинического испытания в Республике Беларусь, изменением длительности приема суточной дозы антигельминтика, несоблюдения доз индометацина и витаминов с селеном. При отказе от солевого слабительного может развиваться цистицеркоз при тениозе.