

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ

УТВЕРЖДАЮ

_____, заместитель министра

_____, Д.Л. Пиневич



_____ 20 17 г.

_____, регистрационный № 112-1117

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ
ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С ЖЕНЩИН
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**
инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ:

Учреждение образования «Белорусский государственный
медицинский университет»¹,

Учреждение здравоохранения «3-я городская клиническая больница
им. Е.В. Клумова» г. Минск²

Авторы: д.м.н., профессор Е.И. Барановская¹, Т.В. Зновец¹, д.м.н.,
профессор С.В. Жаворонок¹, Е.А. Гошкевич², И.Л. Шиптенко²

Минск, 2017

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра

_____ Д.Л. Пиневиц
01.12.2017

Регистрационный № 112-1117

**МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕРОЯТНОСТИ ИНФИЦИРОВАНИЯ
ВИРУСОМ ГЕПАТИТА С ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА**

инструкция по применению

УЧРЕЖДЕНИЯ-РАЗРАБОТЧИКИ: УО «Белорусский государственный
медицинский университет»¹, УЗ «3-я городская клиническая больница им.
Е.В. Клумова» г. Минск²

АВТОРЫ: д-р мед. наук, проф. Е.И. Барановская¹, Т.В. Зновец¹, д-р мед. наук,
проф. С.В. Жаворонок¹, Е.А. Гошкевич², И.Л. Шиптенко²

Минск 2017

В настоящей инструкции по применению (далее — инструкция) изложен метод определения вероятности инфицирования вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста (15–49 лет). Выполнение инструкции даст возможность дифференцированно подходить к обследованию женщин репродуктивного возраста на маркеры вирусного гепатита С в зависимости от полученного прогноза с целью своевременного выявления HCV-инфицированных пациенток, последующего диспансерного наблюдения и противовирусного лечения. Своевременное выявление и лечение женщин с гепатитом С до наступления беременности позволит исключить перинатальную трансмиссию вируса гепатита С от матери ребенку.

Настоящая инструкция предназначена для врачей-акушеров-гинекологов учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь женщинам репродуктивного возраста в амбулаторных условиях.

ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМОГО ОБОРУДОВАНИЯ, РЕАКТИВОВ, СРЕДСТВ, ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ТЕХНИКИ

Не требуется.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Женщины репродуктивного возраста (15–49 лет).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Отсутствуют.

ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДА

Выделение группы риска инфицирования вирусом гепатита С среди женщин репродуктивного возраста (15–49 лет) с использованием прогностической таблицы.

Прогностическая таблица заполняется врачом-акушером-гинекологом или акушеркой смотрового кабинета при диспансерном медицинском осмотре; обращении за медицинской помощью (не чаще 1 раза в год); по показаниям при выявлении новых факторов риска инфицирования вирусом гепатита С.

Таблица — Прогностическая таблица инфицирования вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста

Фактор риска	Номер и название диапазона фактора риска	Диагностический коэффициент
I. Социально-поведенческие факторы		
Возраст	1) до 28 лет	-1
	2) 29 лет и старше	+1
Уровень образования	1) высшее или среднее специальное	-1
	2) общее среднее, базовое или начальное	+3

Профессиональная занятость	1) отсутствие постоянной работы	+2
	2) работа в сфере обслуживания (продавец, контролер-кассир, официант, бармен, парикмахер, горничная, кастелянша, специалист по туризму)	+3
	3) другие специальности	-2
Курение	1) да	+4
	2) нет	-2
Длительность курения	1) менее 5 лет	-5
	2) 11 лет и более	+4
Употребление наркотических веществ	1) да	+12
	2) нет	-1
Семейное положение	1) не состоит в браке	+4
	2) первый брак	-2
	3) повторный брак	+7
Возраст начала половой жизни	1) до 17 лет	+2
	2) 18 лет и старше	-2
Число половых партнеров в течение жизни	1) до 3	-3
	2) 4 и более	+2
Контрацепция	1) отсутствует	+3
	2) барьерный метод	-2
	3) физиологический метод	+1
	4) оральные контрацептивы	-2
	5) внутриматочная спираль	+5
II. Медицинские факторы		
ВИЧ-инфекция	1) да	+12
	2) нет	-1
Вирусный гепатит В	1) да	+12
Венерические заболевания в анамнезе	2) сифилис	+12
	3) гонорея	+12
Хирургические вмешательства в анамнезе	1) не было	-1
	2) одно	+1
	3) два и более	+4
Переливание компонентов крови в анамнезе	1) да	+7
	2) нет	-1
Беременности в анамнезе	1) не было	-2
	3) две и более	+2

Роды в анамнезе	1) не было	-1
	2) одни	+1
	3) двое и более	-3
Медицинские аборт в анамнезе	1) не было	-1
	2) один	+3
	3) два и более	+5
Сопутствующие гинекологические заболевания	1) да	+1
	2) нет	-3
Бесплодие	2) первичное	-2
	3) вторичное	+5
Хронический сальпингоофорит	1) да	+3
СУММА БАЛЛОВ		

При опросе женщины репродуктивного возраста необходимо обвести номера диапазонов согласно имеющимся сведениям и суммировать соответствующие им диагностические коэффициенты. Если диапазон пропущен, диагностический коэффициент равен нулю. После суммирования диагностических коэффициентов выполнить обследование на маркеры гепатита С у пациенток с высоким риском инфицирования вирусом гепатита С согласно алгоритму (рисунок).

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ИЛИ ОШИБОК ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ И ПУТИ ИХ УСТРАНЕНИЯ

Недостаточно собранный анамнез у женщины репродуктивного возраста.



Рисунок — Алгоритм определения вероятности инфицирования вирусом гепатита С женщин репродуктивного возраста